

TRATAMENTO DE HIPERADRECORTICISMO (HAC) EM CÃES COM MEDICAMENTO HOMEOPATICO INDIVIDUALIZADO: RELATOS DE CASOS CLÍNICOS

Andreia Adelaide Gordinho Pinto*; Sandra Augusta Gordinho Pinto*

*Homeopatiavet – São Paulo/SP sanndraagp@gmail.com

Introdução: A Síndrome de Cushing ou Hiperadrenocorticism (HAC) é causada pela superprodução do hormônio cortisol pelo organismo podendo ser de produção endógena, seja por disfunções do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, e a exógena ou iatrogênica, pela administração prolongada de fármacos corticosteroides de uso terapêutico, sendo esta de maior incidência. Tais hormônios controlam a resposta inflamatória e na modulação do estresse e no equilíbrio metabólico¹. A homeopatia é utilizada em distúrbios endócrinos reduzindo os sinais e sintomas do hiperadrenocorticism bem como outros distúrbios endócrinos (AJINAS; SHIBINA, 2021). O objetivo desse relato foi descrever a evolução clínica de 6 cães acometidos pelos sintomas de HAC e tratados com medicamento homeopático individualizado em clínica. **Metodologia:** Os casos foram escolhidos pós diagnóstico clínico e em seguida foi escolhido o medicamento homeopático através de características mentais, gerais e físicas de cada paciente utilizando o software “Repertório Homeopático Digital - HOMEOSOFT 3.0.0.263” e do “Repertório Homeopático Para Médicos Veterinários”. Estudos em cães e equinos acometidos por HAC tem demonstrado eficácia através da abordagem homeopática individualizada demonstrando resultados expressivos além de respostas clínicas semelhantes entre as espécies, indicando uma alternativa terapêutica válida e aplicável (ELLIOTT, 2001). Os medicamentos homeopáticos, Ignatia amara, Calcarea carbonica, Hyosciamus niger, Sulphur, Arsenicum album e Atropa belladonna prescritos em diferentes potências respeitando a individualização, administrados 2 vezes ao dia por 60 dias, manipulados em farmácia credenciada na ANVISA. As avaliações clínicas presenciais foram realizadas em dois tempos na primeira avaliação e em torno de 60 dias após tratamento, por meio de registro com base na anamnese e resultados de exames comparativos. Foi feita análise dos casos clínicos avaliando a eficácia terapêutica do paciente em ambiente clínico, utilizando métodos de acompanhamento de sintomas e também o Naranjo Modified Criteria que permite quantificar a relação causal, experiência terapêutica e evolução clínica ao longo do tempo (NAYAK; SAHOO, 2020). **Resultados:** Ao final do estudo houve relato de redução do volume abdominal pelos responsáveis e melhora em todos os casos estudados nos sintomas de fadiga (41,7%); dor (50%), náusea (55%), dispneia (45%) e erupções cutânea (80%) e redução dos níveis de cortisol basal de 30 a 70 %. **Conclusões:** Conclui-se que o tratamento homeopático individualizado foi capaz de reduzir os sinais clínicos dos cães tratados de cães atendidos em clínica veterinária além da melhora na qualidade de vida.

Palavras-chave: Cães; Hiperadrenocorticism; Homeopatia; Síndrome de Cushing. Os autores declaram não haver conflitos de interesse no referido trabalho

Referências:

AJINAS A; SHIBINA K. Cushing’s syndrome - a systematic review with homoeopathic management. Int. J. Hom. Sci. 2021;5(4):16-19.

doi: 10.33545/26164485.2021.v5.i4a.449

ELLIOTT M. Cushing's disease: a new approach to therapy in equine and canine patients. Br Homeopath J. 2001 Jan;90(1):33-6. doi: 10.1054/homp.1999.0450.

NAYAK C; SAHOO AR. Thlaspi bursa pastoris in treatment of urinary stones: a case series. Homeopathy. 2020 Jul 1; 109(4): 238–242. doi: 10.1055/s-0040-1709705